

Отчет

об апробации кисломолочного продукта СГОЛ 1 – 40 в

Центре хирургии печени и поджелудочной железы МУЗ ГКБ № 8

в апреле 2003 года.

Диетический продукт СГОЛ 1 – 40 был назначен 12 больным, из них было 4 мужчин и 6 женщин. Возраст больных варьировал от 42 до 62 лет. Группу составили:

1. 8 пациентов циррозами печени в стадии суб- и декомпенсации
2. 2 пациента хроническим панкреатитом, болевой формой, с внешне-секреторной недостаточностью
3. 2 пациента с нейродермитом, сопутствующим диагнозом Синдром раздраженного кишечника с преобладанием запоров

Наряду с медикаментозной терапией больные принимали СГОЛ 1 – 40 в течение 2 недель по 1 ст.л. 2 раза в день 5 дней с двухдневным перерывом.




В группе больных с циррозами печени СГОЛ 1 – 40 назначался в составе комплексной терапии печеночной недостаточности, энцефалопатии, как дополнение к существующей диете. Учитывая абдоминальный дискомфорт, часто наблюдающийся у больных декомпенсированными циррозами печени при приеме синтетических дисахаридов (дюфалак, лактулоза), СГОЛ 1 – 40 был ^{назначен} 8 больным. Специальных исследований по изучению нормализации микрофлоры кишечника, показателей иммунитета не проводилось. На фоне приема СГОЛ 1 – 40 у больных улучшился аппетит, уменьшились явления метеоризма и абдоминального дискомфорта без приема ферментативных препаратов, наблюдалась оптимальная частота и консистенция стула.

У больных хроническим панкреатитом, на фоне комплексной терапии и приема СГОЛ 1 – 40, практически не отмечалось метеоризма и абдоминальных болей, нормализовалась консистенция и кратность стула. При расширении диеты на фоне приема препарата не наблюдалось симптомов обострения заболевания.

У больных нейродермитом отмечался регресс кожных высыпаний, кожного зуда, нормализация кратности и консистенция стула.

Побочных эффектов при применении диетического продукта СГОЛ 1 – 40 больные не отмечали. У одной пациентки циррозом печени наблюдалось излишнее увеличение кратности стула, которое было скорректировано при уменьшении дозы СГОЛ 1 – 40.

Руководитель Центра хирургии печени
и поджелудочной железы д.м.н., проф. Пышкин С.А.
Врач-гастроэнтеролог Пирогова И.Ю.

07.05.2003